



# NOV@

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ, ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  
ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Για επαγγελματική χρήση



#### ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:

Α&Ε Στυλιανού Τεχνολογική ΑΤΔ  
Λεωφόρος Αγγελόστασης 18, Κίτο  
Λάρισα, 7550

Τηλέφωνο: 24816363 Φαξ: 24423160

email: [main@technochimiki.com.cy](mailto:main@technochimiki.com.cy)

[www.technochimiki.com.cy](http://www.technochimiki.com.cy)

#### ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: BIOLCHIM S.p.A

Via S. Carlo 2130 - 40059 MEDICINA (Bo) Italy

Tel: +390516971811 ο Fax : +39051852884

[www.biolchim.it](http://www.biolchim.it) ο [biolchim@biolchim.it](mailto:biolchim@biolchim.it)

Export Division: Fax: +39 051 852.856

Customer Care: [customer.care@biolchim.it](mailto:customer.care@biolchim.it)



Concinni speciali

Παρέίδα:

Ημερομηνία λήξης: } βλέπε συσκευασία

Αριθμός Εγγραφής: 2236

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ



## ΛΙΠΑΣΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

|                          | % w / w |
|--------------------------|---------|
| Ολικό Άζωτο (N) .....    | 1       |
| Οργανικό Άζωτο (N) ..... | 1       |
| Οργανικές Ουσίες .....   | 23      |

### Χαρακτηριστικά

- Βελτιώνει την ανάπτυξη και την λειτουργικότητα του ριζικού συστήματος.
- Προάγει την ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη του φυτού.
- Αυξάνει το μέγεθος και την ομοιομορφία των καρπών.

### Μέθοδοι εφαρμογής και δοσολογία

Η δοσολογία να διπλασιάζεται όταν εφαρμόζεται σε σπρεσαριο μένες καλλιέργειες και / ή σε καλλιέργειες με αδύνατο ριζικό σύστημα. Σε αμμώδη εδάφη μειώστε την δοσολογία και αυξήστε τον αριθμό εφαρμογών.

| Καλλιέργεια                                | Χρόνος εφαρμογής  | Δοσολογία Υδρολίπανσης  |
|--|---|---|
| Υπαίθριες καλλιέργειες Λαχανικών           | -10-20 μέρες μετά την μεταρύτευση<br>-Μετά την καρπώδη της πρώτης ανθοστάσις<br>-Δίγκωση καρπού   | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Θερμοκηπτικές καλλιέργειες Λαχανικών       | -10-20 μέρες μετά την μεταρύτευση<br>-Μετά την καρπώδη της πρώτης ανθοστάσις<br>-Δίγκωση καρπού<br>Σε καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, επαναλαμβάνονται οι εφαρμογές περιοδικά. | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Φυλλώδη Λαχανικά                           | -10-20 μέρες μετά την μεταρύτευση   | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Καρποφόρα άνητρα και επιτραπέζια σπαράγγια | -Έναρξη άνθησης<br>-Μετά την καρπώδη<br>-Κατά την δόγκωση καρπού  | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Φρούκια                                    | -10-15 μέρες μετά την μεταρύτευση<br>-Κατά την έναρξη της νέας βλάστησης<br>-Πριν την άνθηση<br>-Για την δόγκωση καρπού   | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Ανθοκαμάδι Φυτά                            | -10 μέρες μετά την μεταρύτευση<br>-Δίγκωση ανθοφόρων οφθαλμών<br>-Επιμήκυνση του στελέχους  | 1.5 – 2.0 L / ΔΕΚΑΡΙΟ   |
| Φυτά σε Γλάστρες                           | -Αμέσως μετά την αλλαγή γλάστρας<br>-Δίγκωση ανθοφόρων οφθαλμών<br>-Επιμήκυνση του στελέχους  | Εφαρμογή με την υδρολίπανση<br>2.0-3.0 L / m <sup>2</sup> νερού |

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Κρατήστε το προϊόν μακριά από το φως και ήλιο, παιδιά, τρόφιμα, ζώα. Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 3°C. Χρησιμοποιήστε το προϊόν πάντοτε με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Αποφύγετε την απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια.