

260 x 150 mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:

Φυλακτείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμασίες/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να μην έρθειε επαφή με μάτια, από τη δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομήκη προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Κατά την ανάμεξη, φόρτωσα καρχιλαίου και χειρισμό να φοράτε ρούχα εργασίας και γάντια καθώς και κατά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού. Να αποφεύγετε την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Λιθρεόη περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την θυμική νομοθεσία. Μη ρυπαντείτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική λύση ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόδους ζητηθεί. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗ ΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σηπτίστε αιμέδως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόδους είναι εύκολο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθηρώα αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 1401

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις σκευάσματος-Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργεία ημέρα/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: ΕΣΣΕΡΙΔΟΣΕΙΔΗ (Γκρέφουρτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράτα, Λιμεντές (Πράσινα λεμονιά), Κιτριά, Νεραντζά, Κουμουνάτ, Περγαμόντο): για Φυτόφθρως με δόση 150-250 κ.εκ./100 λίτρα φυκ. υγρού (150-875 κ.εκ./δεκ. μένιστρη). Όγκος φυκ. υγρού 100-350 λίτρα/δεκ., με ψεκασμούς φυλλώματος μετά την έκπτωση των βλαστών BBCN>40. Μέγιστο 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 20 ημέρων. ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσμα και επιταράξα σταφύλια): για Περονόσπορο με δόση 150-250 κ.εκ./100 λίτρα φυκ. υγρού (75-250 κ.εκ./δεκ. μένιστρη). Όγκος φυκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., με ψεκασμούς φυλλώματος από το τέλος της ανάπτυξης του φυλλώματος και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασπένειας BBCN>20. Μέγιστο 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρων. ΕΛΙΑ: για Κυκλοκόνια με δόση 150-250 κ.εκ./100 λίτρα φυκ. υγρού (120-250 κ.εκ./δεκ. μένιστρη). Όγκος φυκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ., με ψεκασμούς φυλλώματος από την έναρξη της βλάστησης και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασπένειας BBCN>20. Μέγιστο 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρων.

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής. 2. Οι εφαρμογές είναι προηπικές και γίνονται εφόδουν οι καρκές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα Προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Ελιά: 15 ημέρες.

Συνδυαστικότητα: Το σκευάσμα δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο (νιτρικό και αμμωνιακό). Να μην γίνεται ανάμειξη με ελαιούχα σκευάσματα ή να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με ελαιούχα σκευάσματα, καθώς αυτό θα εμποδίζει το προϊόν να διεισδύσει στο φυτό.

MYKHTOKTONO CUNEB

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση.

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Potassium phosphonate: 51% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 45,5% β/β

Αριθμός Άδειας: 3698

Κάτοχος της άδειας:

LAINCO S.A, Polígono Industrial Can Jardi,
Avda. de Bizet, 8-12 08191 Rubí, Barcelona, Ισπανία.

ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ

Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

Λεωφόρος Αγγελόκητης 18, 7550 Κίτι
Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160
Email: main@technochimiki.com.cy
www.technochimiki.com.cy

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L

Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση. Δρα σε πολλαπλές θέσεις (multi-site contact group M1). Μετά την εφαρμογή, δρα σε δύο στάδια: επιβραδύνει την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας την φυσική άμυντων φυτών.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώνες δόσεις και καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Επειδή η δ.ο. δρα σε πολλαπλά σημεία, δεν αναιμένονται φαινόμενα ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά προτείνεται η χρήση του CUNEB σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης έτσι ώστε να μειωθεί περεταίρω η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Μετά την εφαρμογή, μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε περίπτωση επανεισόδου φοράτε ρούχα εργασίας και γάντια. Τηρείτε ένα διάστημα επανεισόδου 12 ημέρων για εφαρμογές σε επεστρεψιδή (μετά τη δεύτερη εφαρμογή) και 10 ημέρες για τα σταφύλια (μετά την τρίτη εφαρμογή), διατηρώντας την ψεκαστική βιτιό. Ζεπλύνετε το βιτό και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού βιτιό. Ζεπλύνετε το βιτό και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού βιτιό, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστικού:** Αδειάστε τελείων το ψεκαστικό βιτιό. Ζεπλύνετε το βιτό και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού βιτιό, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή λίγες τριτολό έξιλμα (τα νερά του επιλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρόπημα για τη διασφάλιση της μη περατέταιρης χρήσης, θα εναποτελούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Διατρέπεται μόνο στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Αρ. Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής.:
Βλέπε συσκευασία

